

NUMERO 10 - octobre 2012
CHF 7.- / Euro 4,50

LE CHIEN MAGAZINE



Le magazine de l'Homme et du chien

**Luc Borer
et Ginka**

Société

Le Bouddhisme en Suisse

Immersion

La chirurgie orthopédique

Comportement

Il casse tout à la maison...

Nutrition

Le dog Nuggets

Chiens et culture

Croc-Blanc



9 771662 720001

Dysplasie de la hanche: approche thérapeutique innovante par traitements chiropratiques

TEXTE ET PHOTOS • REGULA SCHRENK, MÉDECIN-VÉTÉRINAIRE, CHIROPATICIEN VÉTÉRINAIRE IVCA ET IAVC

La dysplasie de la hanche est une affection ostéoarticulaire qui résulte d'un trouble du développement de l'articulation coxo-fémorale, engendrant une instabilité de cette dernière.

Cette maladie complexe est influencée par de multiples facteurs tels que la génétique, la croissance, la morphologie, l'exercice, la nutrition et la balance hormonale

La symptomatologie de la dysplasie coxo-fémorale est polymorphe. Certaines dysplasies très sévères peuvent demeurer asymptomatiques pendant plusieurs années, tandis que d'autres nettement moins marquées provoquent une boiterie importante et invalidante.

Le chiot de moins de 6 mois montre des anomalies de la démarche et/ou du comportement plutôt qu'une boiterie véritable. Une démarche chaloupée sur les postérieurs au pas est observée avec un roulement du bassin. L'arrière pas est limité. Il peut présenter des difficultés au relever. Lors de la course, le chien peut ramener les deux postérieurs en même temps, comme un lapin. Il présente fréquemment une incapacité ou un refus du saut et/ou de l'exercice prolongé.

La dysplasie de la hanche est une affection de croissance. La période critique de l'initiation de cette pathologie se situe entre la naissance et l'âge de 2 mois. Les os, les muscles et les nerfs ne sont pas encore largement développés et les tissus mous de cette articulation peuvent être soumis à des stress dépassant leurs limites d'élasticité. Les masses musculaires sont incapables de se développer au même rythme que le squelette osseux et de ce fait ne peuvent adéquatement maintenir la tête fémorale dans la cavité acétabulaire.

Examen chiropratique

L'examen chiropratique détecte une mobilité de l'articulation du bassin fortement limitée, une musculature contractée et une douleur prononcée.

Traitement chiropratique

L'objectif est de corriger la posture, de tonifier les zones affaiblies, de détendre la musculature douloureuse des régions contracturées par thérapie des points «Trigger», de traiter de façon ciblée l'articulation touchée, de contrôler et débloquer les articulations vertébrales, pelviennes et des extrémités déjà affectées par compensations.

Le traitement chiropratique a pour but de diminuer ou de supprimer la douleur, de ralentir ou prévenir l'arthrose secondaire et permettre un retour à une activité normale, voire satisfaisante.

Il ne corrige ni les lésions secondaires dues à la dysplasie ni les causes de cette affection mais visera à rétablir un fonctionnement adéquat de l'articulation touchée en exerçant un guidage progressif de son mouvement.

La précocité de l'intervention est un facteur déterminant du taux de réussite, la prévention restant la meilleure façon de limiter voire d'éviter l'arthrose.

Pour plus de détails, je vous invite à visiter mon site web:

www.chiromedvet.ch

SOCIÉTÉ
VAUDOISE
DES
VÉTÉRINAIRES

www.veterinaires-vaudois.ch

